

DEUX PENTATOMIDES NOUVEAUX DE L'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

PAR

le Dr H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

1. — *Basicryptus pictus* n. sp.

Belle espèce, remarquable par la netteté de contraste de coloration de la face supérieure. En dessus, brunâtre flavescent; la tête nettement plus claire, notamment une large zone latérale, laissant le triangle basal plus foncé, l'extrême bord foncé; la partie du pronotum en avant de la ligne interhumérale d'un flavescent clair, à l'exception des cicatrices, le bord latéral un peu assombri; le contour et le centre des cicatrices, ainsi qu'une tache en arrière du bord antérieur près de l'angle antérieur de la cicatrice et plus ou moins unie à celle-ci, d'un noir brillant. Écusson offrant une bande médiane et une bande marginale (submarginale à la base) d'un flavescent clair, irrégulières et calleuses, les bandes latérales atteignant ou non l'apex; dans les angles de la base, une dépression allongée noir brillant, à reflets métalliques vert violet, séparant le bord latéral de la base de la bande flavescente, celle-ci lisse sur cet espace; contre cette bande, une autre tache basale noire, plus petite. Élytres avec la côte lisse, flavescente, interrompue; en outre, des espaces flavescents plus ou moins impondués, formant une raie longitudinale à la nervure subcostale et une bande plus ou moins nette sur le disque; un trait court à la base près de la côte, noir. Membrane hyaline, les nervures faiblement rembrunies. L'extrême bord du connexivum flavescent lisse. Dessous plus irrégulièrement varié de clair. Tête pâle, avec une tache noire

entre l'œil et la base de l'antenne. Poitrine avec une bande latérale plus claire, marquée en dedans sur chaque segment d'un trait noir près des hanches; le métastethium avec, en dehors de cette bande, une bande marginale noir brillant, à reflets, laissant cependant le bord postéro-externe flave et lisse, à part quelques points grossiers; sur le prostethium et le mésostethium cette bande est remplacée par une macule ou un trait noir. Ventre avec une bande médiane, une bande latérale de chaque côté du disque (continuant les bandes latérales de la poitrine) et une bande plus étroite submarginale, flavescent brunâtre clair, ces bandes atteignant l'extrémité du 6^e segment; la partie restée brunâtre est cependant plus ou moins variée de flavescent, dans la partie brunâtre limitée par la bande flavescente latérale et la bande submarginale se trouvent les stigmates, ceux-ci sombres et entourés d'une macule lisse flavescente. Pattes semées de brun, l'extrémité des tibias plus foncée, les tarses brunâtres. Antennes brunes, le 4^e article dans sa moitié apicale et le 5^e en entier, noirs. Tête de longueur moyenne; juga contigus en avant, l'apex arrondi régulièrement; la base modérément bombée. Pronotum transversal, les angles latéraux formant avec les côtés une saillie nette: l'angle obtus ainsi formé a le bord antérieur un peu arqué, le bord postérieur légèrement sinué; modérément convexe, la partie basale ruguleuse, la partie antérieure à rides transversales et flavescent clair; ces deux parties séparées nettement par leur coloration distincte; les bords antéro-latéraux à peine sinués, à dents nettes. Écusson allongé, ruguleux transversalement (peu sur les bandes flavescentes); l'apex angulé arrondi. Dessous ponctué rugueux, moins dans les bandes claires, la ponctuation plus ou moins rembrunie.

Longueur : 18.5-19.5 millimètres.

Le Musée de Tervueren possède ce remarquable *Basicryptus* de l'Afrique orientale anglaise : Tsavo river, VI-1913, et Campi Kiboko, par le D^r BAYER. Le « Museo Civico di Storia Naturale » de Gênes me l'a également communiqué de diverses localités du pays des Somalis.

2. — *Thoria zuwanica* n. sp.

Voisine de mon *Thoria Neavei*, mais plus allongée, à côtés subparallèles. La tête plus longue également. Pronotum à bords antéro-latéraux irréguliers, mais moins que chez *Neavei*, un peu courbés entre l'angle latéral et la dent antérieure, celle-ci oblique en dehors. Écusson allongé, les angles de la base marqués d'une fovéole noire bien nette, contre laquelle en dedans se trouve une macule calleuse claire; l'extrémité arrondie. Corie aussi longue que l'écusson, plus étroite que celui-ci au niveau des sinus latéraux. Coloration plus claire que *Neavei*, flavescent grisâtre ou jaune ivoire, à ponctuation brun

ferrugineux ou noirâtre, plus intense sur les côtés de la tête. Pronotum offrant des rides transversales sur le disque calleux ou éparsément ponctué. Écusson avec la zone longitudinale médiane éparsément ponctué, de même que la région intéro-apicale de la corie, dont la bordure externe est imponctué; membrane à nervures sombres. Suture des segments connexivaux marquée de brun ou de noir à l'angle basal des segments. Poitrine plus foncée, la ponctuation plus intense et la coloration diffusant, surtout au long des hanches; disque ventral d'un noir-poix, le milieu éclairci; une large zone latérale, s'étendant de chaque côté des stigmates (plus en dedans qu'en dehors), plus claire et à ponctuation sombre; la bordure externe très finement ponctué ou imponctué, l'angle basal des segments noir, de même que les stigmates. Pattes pâles, à ponctuation sombre peu dense. Antennes pâles, semées de points sombres, 5 rembruni presque en entier; 2 plus court que 3, 3 égal à 4 à peu près, 5 un peu plus long, fusiforme. ♂♀

Longueur : 7.5-7.75 millimètres.

Récoltée dans l'Afrique orientale anglaise : Zuwani, 28-VI-1913, par le Dr BAYER (Musée de Tervueren).